Список литературы:

1. Васин, А.М. Заповедник «Малая Сосьва» / А.М. Васин, А.Л. Васина.—Москва : Унисерв, 2000.—151 с.: фото.
2. Насибуллина, А. Заповедные уголки Югры / А. Насибуллина // Югра.—2010.—№ 7.—С. 46—51.
3. Швец, Г. Заповедная биография / Г. Швец // Югра.—2011.—№ 1.—С. 82—85.
4. Швец, Г. Край чистых озёр и поющих сосен / Г. Швец // Югра.—2011.—№ 3.—С. 44—47.






Составитель: А. Кожухаренко



Муниципальное учреждение культуры
«Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района»

# *По заповедным местам Югры*



Октябрьское

2011

## Государственный природный заповедник «Юганский»



**Юганский заповедник** — особо охраняемая природная территория, расположенная в Сургутском районе Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, в бассейне реки Большой Юган (левый приток Оби).

Юганский государственный природный заповедник создан 31 мая 1982 года в междуречье Негусъяха и Малого Югана (правые притоки Большого Югана).

Юганский заповедник создан для сохранения и изучения практически не нарушенных экосистем Среднего Приобья - задача более чем актуальная в связи с продолжающимся активным освоением нефтегазовых и лесных ресурсов Западной Сибири. Организация заповедника происходила в момент наибольшей интенсификации нефтедобычи, и, по данным предварительной рекогносцировки, Юганский заповедник является единственным относительно нетронутым участком в этом районе Тюменской области.

### Растительный мир

Флора сосудистых растений заповедника относительно бедна по сравнению с флорой среднетаежного Приобья в целом, что связано с небольшим разнообразием ландшафтов. В заповеднике отмечено 320 видов сосудистых растений, относящихся к 67 семействам. Наиболее широко представлены семейства осоковых (30 видов), сложноцветных (27), орхидных (15), розоцветных (21) и лютиковых (19). Инвентаризация бриофлоры заповедника еще не завершена. Список мхов пока насчитывает 76 видов, относящихся к 27 семействам (вместе с печеночными мхами). Самое представительное семейство мохообразных в заповеднике - сфагновые (19 видов). Для территории Юганского заповедника выявлено 165 видов, 14 вариантов и 16 форм лишайников из 23 семейств и 45 родов. Видовой состав грибов и водорослей еще не изучен.

И это не случайно. Они представляют собой уникальный комплекс крупных и мелких проток, островов суши, озеровидных водоёмов, мест массового гнездования и концентрации во время линьки водоплавающих птиц, чей пролётный путь пролегает как раз через Двуобье.



**Государственный комплексный заказник районного значения «Аганский»**

Создан на территории Нижневартовского района и нужен для того, чтобы сохранить популяцию промысловых животных – соболя, белки, ондатры, норки, бурого медведя.

**Государственный комплексный заказник окружного значения «Вогулка»**

Заказник окружного значения "Вогулка" образован постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 11.03.97 г. № 97.

Заказник создан с целью сохранения популяции лося и северного оленя на путях сезонной миграции на местах зимнего отстоя, сохранения и восстановления среды его обитания, а также для воспроизводства и охраны ценных промысловых видов зверей и птиц.

**Государственный биологический заказник регионального значения «Сорумский»**

**Заказник окружного значения «Сорумский»** образован постановлением Главы администрации Ханты-Мансийского автономного округа от 01.08.95 № 160.

Заказник создан для сохранения Сорумской популяции лося на путях его сезонных миграций, сохранения и восстановления нарушений в процессе антропогенеза среды его обитания, воспроизводство и охраны ценных промысловых видов других животных и птиц, и для поддержания общего экологического баланса.



Из видов, включенных в Красную книгу РСФСР, в заповеднике найдены лишайник лобария легочная, орхидное - надбородник безлистный и два вида грибов - рогатик пестиковый и ежевик коралловидный.



Несколько видов растений находятся у северной границы своего ареала и поэтому встречаются довольно редко. К ним относятся лилия кудреватая (саранка), лук победный (черемша), тайник овальный, мякотница однолистная, башмачок пятнистый.

По геоботаническому районированию территория заповедника относится к Салымо-Юганскому округу подзоны средней тайги. Для растительности этого округа характерно преобладание на водоразделах елово-кедровых лесов с участием пихты, а менее дренированные центральные участки междуречий заняты выпуклыми олиготрофными болотами. Лесная и болотная растительность тесно взаимосвязана и нередко переходят одна в другую.



Кедр является одной из основных лесообразующих пород в районе заповедника. Он обладает широкой экологической пластичностью - выносит засуху, морозы (-60°С), весенние затопления и поэтому встречается как на хорошо дренируемых, так и на заболоченных или переувлажненных участках. Будучи в целом светолюбивой породой, кедр очень теневынослив в молодом возрасте и более требователен к свету с наступление плодоношения. Такие свойства позволяют кедру образовывать как смешанные, так и чистые леса в различных лесорастительных условиях. Елово-кедровые зеленомошные леса с присутствием пихты являются конечной стадией смены растительного покрова после пожаров.

Подлесок представлен самыми обычными видами - шиповником иглистым, рябиной сибирской, жимилостью Палласа, малиной. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают брусника, линнея северная, черника, майник двулистный, седмичник европейский, грушанка круглолистная, хвощ лесной, голокучник трехраздельный. Моховой покров образован гилокомиумом блестящим, плеуроциумом.



Места пожарищ чаще всего зарастают мелколиственными породами - осиной и березой. Они обладают высокой семенной продуктивностью и хорошей способностью к распространению семян. Осина и береза растут быстро и легко переносят экстремальные условия открытых пространств. Под их пологом начинает формироваться будущий темнохвойный лес. Достигнув возраста 120 лет и больше, осина и береза начинают интенсивно выпадать. Полог прореживается, что позволяет темнохвойным породам выйти в верхний ярус.

## Животный мир

В целом фауна заповедника пока изучена недостаточно. Из моллюсков довольно типичны большой прудовик (в старицах) и беззубка (в реках). Есть и сухопутные формы слизней.



В 1987 г. сотрудниками и студентами кафедры беспозвоночных Пермского университета было начато изучение фауны пауков. В настоящее время их список составляет 71 вид; наиболее заметны ликозиды и крестовики.


Среди насекомых заповедника преобладают различные жуки, двукрылые и чешуекрылые.

Очень быстро насекомые разрушают грибы, как живущие на деревьях, так и напочвенные. В качестве потребителей грибов в настоящее время выявлено 144 вида насекомых. Это различные луговики, грибные комарики и точильщики.

На переработке опада, навоза и павших животных специализируются многочисленные навозники, жуки мертвоеды и стафилины (мертвоед матовый, могильщик-изыскатель, мертвоед



гуменник, казарка краснозобая, гусь белолобый, кряква, шилохвость, свиязь, широконоска и другие птицы.



## Государственный комплексный заказник «Унторский»

В 1995 году площадь заказника была увеличена до 81525 га и он приобрёл региональный статус и окружное подчинение.

Заказник расположен в Октябрьском районе с целью сохранения воспроизводства и восстановления животных, птиц и среды их обитания, а также для поддержания общего экологического баланса в районе.

## Памятник природы «Шапшинские кедровники»

Площадь 270 га, расположен в районе посёлка Шапша Ханты – Мансийского района создан, чтобы сохранить уникальные кедровые насаждения.

## Лесоболотная зона «Большая Каюковка»

Расположена в Сургутском районе в 75 км от посёлка Угут. Здесь сосредоточены основные типы болот и лесов, характерные для среднетаёжной зоны Западной Сибири.

## Озеро «Ранге-Тур»



Передано под охрану заповеднику «Малая Сосьва». Его площадь достигает 880 га. Этот памятник природы интересен ещё и тем, что здесь предпочитает гнездиться такая редкая птица, как орлан-белохвост.

## Водно-болотные угодья «Верхнее Двуобье» и «Нижнее Двуобье»

Носят статус природного парка международного значения.

Среднеобской провинции зоны Западно-Сибирской континентальной тайги.



Наиболее распространенны среди древесных пород: сосна, береза, ель, пихта, кедр, осина, лиственница.

Центральная и южная часть заказника занята сосновыми кустарничково-зеленомошными, кустарничково-сфагновыми, лишайниковыми лесами. На песчаных почвах речных террас и междуречных гривах растут высококачественные боры II-III классов бонитета. В северной и западной частях лесные насаждения представлены елово-пихтовыми лесами с примесью кедра. В покрове участвуют зеленые мхи, багульник, черника, кислица. В долинах рек Сеуль, Ковенская и их притоках распространены смешанные леса от II до V классов бонитета. Мелколиственные породы участвуют во всех насаждениях. К водораздельным болотам примыкают обширные по площади сосновые и березовые леса пушицо-сфагнового или кустарничково-сфагнового типа.





**Государственный биологический заказник регионального значения «Берёзовский»**

**Государственный биологический заказник «Берёзовский»** создан для охраны промысловых зверей и птиц. Территория заказника имеет хорошую кормовую базу и защитные условия для размножения водоплавающей и болотной дичи.

Из водоплавающих птиц здесь обитают серый гусь, гусь -



темный, стафилины падальный и рыжий).

Украшением темнохвойных лесов являются бабочки ленточницы, которые предпочитают летать в сумеречное время. Особо следует выделить среди них голубую орденскую ленту и малого ночного павлиньего глаза, которые ранее были занесены в Красную книгу СССР и РСФСР.

На дорогах и береговых откосах в сосняках часто встречаются скакуны лесной и межняк, несколько реже - полевой. Под пологом леса привлекают внимание муравейники рыжих муравьев, которые являются главными регуляторами численности растительноядных насекомых сосняков.

Своеобразен мир насекомых на лесных полянах, зарастающих старицах и просеках с цветущими травянистыми растениями и кустарниками. Здесь во множестве можно встретить различных мух-журчалок (шмелевидная, северная, глазчатая, осовидная и пр.), различных цветочных усачиков родов Лептура и Странгалия (лептура зеленая, желтая, странгалия четырехполосая, усач кроваво-красный). Здесь же кормятся многие бабочки (большая лесная перламутровка, желтушка торфяниковая, лимонница, несколько видов углокрыльниц и голубянок, самая распространенная из которых малинная).



В околоводных местообитаниях – на пойменных лугах и болотах – многочисленны и разнообразны стрекозы. Наиболее редкими среди них можно считать представителей семейства красоток (красотка-девушка и красотка блестящая).

На пойменных лугах часто встречается еще один редкий вид бабочек - махаон, размножающийся на цветущих зонтичных растениях.

На верховых болотах особого внимания заслуживают цикады (в массе встречается пенница слюнявая), несколько видов кобылок и серый кузнечик.



Здесь же чаще всего можно встретить таких бабочек как чернушка Легея, обыкновенная медведица, а также голубянок аргус и Фишера.

В стоячих и проточных водоемах обитает множество хищных насекомых - жуки-плавунцы, клопы, нимфы поденок, личинки стрекоз и другие, поедающие друг друга в борьбе за жизнь.

Различные кровососущие насекомые на протяжении всего теплого времени года буквально осаждают всех теплокровных. Комары появляются в конце мая, а в июне достигают своей наибольшей численности. В конце июня к ним добавляются мошка и слепни, пиклета которых приходится на первую половину июля. В августе появляется мокрец. Все вместе они делают жизнь млекопитающих и работу человека в лесу буквально невыносимой.

Изучению фауны позвоночных животных уделяется больше внимания. Жизненный цикл большинства видов рыб, встречающихся в реках и озерах заповедника, тесно связан с озерно-речной системой средней Оби, расположенной за пределами охраняемой территории.

Видовое разнообразие рыб в заповеднике невелико по сравнению с низовьями рек. Здесь преобладают рыбы из семейств карповых, окуневых и щуковых, приспособившихся к обитанию в медленнотекущих реках и озерах заморной зоны бассейна. Всего зарегистрировано 10 видов рыб: щука, караси золотой и серебряный, окунь, ерш, пескарь, язь, плотва, елеп и гольян.

Земноводные немногочисленны, всего их 4 вида. В старицах и пойменных озерцах достаточно часто можно встретить личинок сибирского углозуба. В понижениях рельефа, в заболоченных и пойменных биотопах часто встречается остромордая лягушка. Там же возможна встреча и с сибирской лягушкой, но за 10 лет исследований было найдено всего 2 экземпляра. Четвертым представителем амфибий является серая жаба. Встречается она повсеместно, но предпочитает пойменные биотопы. Пресмыкающиеся представлены двумя видами: живородящей ящерицей и обыкновенной гадюкой. Ящерица встречается повсеместно, но предпочитает хорошо прогреваемые участки леса и болот. Гадюка же достигает наибольшей численности на верховых водораздель-






**Государственный природный заказник федерального подчинения «Васпухольский»** создан 23 декабря 1993 года.

Территория заказника расположена в западной части лесоболотной зоны Западно-Сибирской равнины, на территории Ханты - Мансийского и Кондинского районов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры.

Заказник создан в целях сохранения популяции таежного северного оленя и воспроизводства ценных охотничье-промысловых животных и редких видов, занесенных в Красную книгу РСФСР. Состав его фауны и флоры типичен для западносибирской тайги.

## Животный мир

Из птиц обитает беркут, вероятно обитание черного аиста, кречета. Из тетеревиных птиц круглый год обитают глухарь, рябчик и тетерев. Белая куропатка обычна в зимние сезоны.



В границах заказника наиболее обычны северный олень, лось, лисица, соболь, выдра, горностай, колонок, заяц-беляк, белка, медведь, регулярно встречается волк, малочисленна норка (предположительно в основном американская), редки – росомаха и рысь, единична куница, возможно обитание барсука. На реках и озерах обитает ондатра. Из других обитателей заказника следует упомянуть бурундука, ласку, водяную полевку, белку-летягу и крота. Заходами в зимние сезоны в заказнике бывает песец, в летний период – косуля. В западной части заказника, в бассейне р. Юконда, в недавнем прошлом обитал «краснокнижный» вид – азиатский речной бобр.



## Растительный мир

Из «краснокнижных» растений наиболее вероятно произрастание орхидей.

По геоботаническому районированию территория расположения заказника относится к среднетаежной болотной подзоне

## Государственный природный заказник Верхне - Кондинский

**Заказник «Верхне – Кондинский»** образован 30 апреля 1971 года, с целью сохранения, воспроизводства и восстановления, нуждающихся в охране диких животных вместе со средой их обитания, а также для поддержания общего экологического баланса.

### Животный мир



Встречается 42 вида млекопитающих, 183 вида птиц, 2 вида рептилий и 3 вида амфибий.

Здесь обитают лось, северный олень, медведь, волк, лиса, рысь, росомаха, соболь, горностай, колонок, американская норка, ласка, белка обыкновенная, белка-летяга, ондатра и другие более мелкие млекопитающие. Под особой охраной с начала организации заказника находится североазиатский речной бобр, включенный в Красные книги МСОП и РФ, как редкий восстанавливающийся вид.



Из птиц обычны: глухарь, тетерев, белая куропатка, рябчик. На реках и озерах встречаются различные виды водоплавающих птиц. В заказнике гнездятся скопа, орлан-белохвост, занесенные в Красные книги МСОП и РФ, редкий в Тюменской области лебедь-кликун, серый журавль. На пролете встречаются краснозобая казарка, стерх.



В реке Конда и ее притоках обитает щука, окунь, плотва, елец, язь, налим, а в озерах и старицах - карась и гольян. Верховья Конда и ее притоки являются местами зимовок рыбы.

### Растительный мир

На территории заказника выявлено 390 видов сосудистых растений.


## Государственный природный заказник «Васпухольский»



ных болотах.

По орнитогеографическому районированию Западно-Сибирской равнины заповедник расположен на Васюганском участке, для которого характерны болотно-таежные виды. К 1998 г. известно 204 вида, которые распределяются между 15 отрядами, 26 семействами. Гнездовая орнитофауна насчитывает 115 видов.

Девять видов птиц занесены в Красную книгу России: кулик-сорока, черный аист, орлан - белохвост, беркут, скопа, кречет, филин, краснозобая казарка, пискулька и сапсан. Кроме перечисленных птиц, можно видеть серого сорокопута и клок-туна. Кулик-сорока часто встречается на пролете и возможно гнездится. Черный аист – постоянный, но очень редкий обитатель. Известно несколько мест, где он встречается регулярно. Скопа – редкий вид, численность которого в настоящее время низка.



Редкими для Тюменской области считается еще 10 видов птиц, обитающих в заповеднике: чернозобая гагара, лебедь-кликун, турпан, осоед, тетеревятник, перепелятник, полевой лунь, белая куропатка, воробьиный и мохноногий сычи.



Численность тетеревиных птиц в заповеднике колеблется в следующих пределах: глухарь 800–900, тетерев – 900-1000, рябчик – 2–4 тыс., белая куропатка – 200 особей.

По данным учетов на р. Негусъях в июне встречается 11 видов пластинчатоклювых.

Кроме пластинчатоклювых к водоемам приурочены кулики - перевозчик, черныш, а в отдельные годы мородунка. На пойменных участках березово-елового леса гнездятся садовая славка, садовая камышевка, соловей-красношейка и другие птицы. Хорошая кормовая база и близость воды привлекает сюда птиц, характерных для темнохвойных лесов - московку, пухляка, снегиря, рябчика, а также птиц, обитаю-



щих на болотах – белошапочную и камышевую овсянок, овсянку-крошку, дубровника. Ивы в период цветения обеспечивают кормом большие стаи свиристелей, которые в весеннее время, кроме прошлогодней клюквы, поедают ивовые соцветия. Доминируют в пойменных лесах вьюрок, московка, зеленая пеночка, пухляк. Несколько реже здесь можно встретить зяблика, овсянку-ремеза, славку-завирушку, теньковку, перевозчика. Групп у немногочисленных видов образуют белобровик, певчий и темнозобый дрозды, трехпалый дятел, снегирь, чиж, сойка. Общее количество видов достигает 68.



В ручьевых ельниках основу населения птиц составляют овсянка-ремез, клест-еловик, синехвостка, чуть меньше пеночек-таловок.

Производные осиновые леса по количеству видов уступают пойменным темнохвойным лесам. Преобладают дуплогнездники – большой пестрый дятел, трехпалый дятел, желна, обыкновенная горихвостка. Кроме перечисленных видов, обычный пухляк, московка и пятнистый конек, в небольшом числе встречаются вьюрок, овсянка-ремез, рябчик. Всего в этом биотопе обитает 24 вида птиц.

В сосновых лесах доминирует вьюрок, чуть меньше пятнистых коньков, обычны свиристель, серая и малая мухоловки, кукша. Очень редкий здесь вид – козодой. В заболоченных сосняках встречается сероголовая гаичка, редко – ястребиная сова. В кустарничко-сфагновых сосняках находятся глухариные тока, здесь же самки водят свои выводки.

Типичный обитатель верховых болот - тетерев; в некоторых местах заповедника он достигает высокой численности. Доминирующими видами верховых болот являются овсянка-крошка, белошапочная овсянка, пятнистый конек. На грядовомочажинно-озерковых участках верховых болот, кроме перечисленных видов, обитают кулики и утки. На пролете здесь останавливаются субаркты – песочники, пуночки, лапландский подорожник, иногда – белолобый гусь. Зимой здесь можно встретить полярную сову. Всего на верховых болотах насчитывается от 20 до 50 видов, но в гнездовое время их число редко превышает 33.


На болотах переходного типа доминируют дубровник и большой веретенник, их дополняют еще 23 вида: турухтан, ду-



Открытые безлесные участки, при обилии водоемов, - идеальное место для гнездования водоплавающей птицы. А сама Обь, со своими притоками, - это основная магистраль весеннего и осеннего пролета птиц, многие из которых оседают в заказнике. Своеобразны их пастбища - пойменные озера, поросшие мелкой сочной «муравой». На таких сорах любят кормиться гуси, лебеди, утки, чайки и кулики.



Кроме гоголей и лупков на островах, луговинах и гривах Елизаровского заповедника гнездятся: чернеть косатая, шилохвость, свиязь, два вида чирков, широконоска, кряковый селезень, красноголовый нырок, гусь - гуменник, серый гусь, белолобый гусь, лебеди, чайки, кулики.



В устье протоки Сосновой на раскидистой ветле, уже не первый год гнездится орлан-белохвост. В наше время - это редкая птица, занесена в Красную книгу. Краснозобая казарка (тоже занесена в Красную книгу) в заказнике бывает во время весеннего и осеннего перелета. Гнездится она в тундре.



Встречаются и нетипичные для здешних мест птицы – соловей - красношейка, выпь, малая поганка.

Флора мохообразных насчитывает 98 видов, из них в Красную книгу Ханты – Мансийского автономного округа - Югры занесены 5: фискомитрелла отклоненная, неккера перистая, бриогаплокладиум мелколистный, бриния новоанглийская, плагиотециум скрытный.




Флора лишайников насчитывает 172 вида, из которых в Красную книгу Ханты – Мансийского автономного округа - Югры занесены 4: коллема чернеющая, бриория буроватая, тукнерария Лаурера, феофисция коротко щетинисто-волосистая.



## Животный мир

Заказник - хорошая кормовая база. Острова и гривы продуваются ветрами, поэтому «гнус» здесь гораздо меньше беспокоит зверей, чем в тайге. Для лосей готовят солонцы, делают подвалку осин для местных животных.



Зиму лоси проводят вдали от заказника, в труднопроходимой смешанной тайге.

Хорошо прижились здесь ондатра и барсук, жир которого имеет лекарственное значение. Численность барсуков, живущих колониями, увеличивается.

Такие животные, как волк, росомаха, песец, выдра в заказнике бывают на проходе. Очень редки - соболь, ласка. Колонок, белка встречаются во время миграции. На просторах заказника «мышкует» лисица.





пель, фифи, лесной конек, чибис и другие. Кроме дубровника, в зарослях карликовой березы здесь гнездятся луговой и черноголовый чеканы, серая славка и другие виды.

На низинных болотах обычен певчий сверчок. На участках низинных болот, граничащих с переходными, встречаются коростель и погоныш.



Распределение птиц меняется по сезонам.

Изучение териофауны на территории заповедника начато в 1984 г. К 1997 г. сотрудниками научного отдела отмечено обитание 36 видов млекопитающих, принадлежащих к 6 отрядам и 13 семействам.

Среди насекомоядных наиболее многочисленны представители семейства землеройковых. Из нескольких отмеченных видов наиболее часто встречаются обыкновенная и малая бурозубки, предпочитающие темнохвойные пойменные леса, их численность в сосновых лесах значительно ниже.

Среди рукокрылых пока отмечен лишь единственный вид - северный кожанок, изредка попадающий в паутинные сети при отлове птиц для кольцевания.

Многочисленный отряд грызунов представлен 15 видами. Типична белка обыкновенная, населяющая все лесные биотопы.

Бурундук также распространен по всем лесам заповедника. Предпочитает темнохвойные и смешанные леса средней полноты.

Широко распространена, но малочисленна летяга. Из-за сумеречного образа жизни видеть ее удается редко. Распространение летяги связано с наличием в составе лесных насаждений осины, где она поселяется в дуплах.

Важной составляющей таежной фауны являются мышевидные грызуны, служащие основной пищей различных хищников. Среди пойманных в ловушки зверьков доминирует красная полевка, которая встречается практически во всех биотопах. Рыжая полевка встречается значительно реже и в гораздо меньшем количестве. Немногочисленна красно-серая полевка, еще реже встречаются лесная и полевая мыши, а также темная полевка. В заболоченных лесах и на болотах отмечены лесной лемминг и полевка-экономка. На территории заповедни-



ка, возможно, обитает мышь-малютка, следы ее жизнедеятельности находили в охранной зоне. По берегам ручьев и рек с густой травяной растительностью обитает водяная полевка.

Ондатра была акклиматизирована в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре в 1933-1937 гг. и быстро достигла промысловой численности. В заповеднике ондатра населяет реки, старицы и озера практически по всей площади, однако высокой численности нигде не достигает.

Единственным представителем зайцеобразных является заяц-беляк. Встречается он во всех биотопах, включая обширные водораздельные болота. Самые излюбленные его места – поймы рек с густыми зарослями ивняка.

Из хищных млекопитающих в заповеднике обитает 13 видов. Самый многочисленный представитель семейства куньих – это соболь. Соболь, обитающий в нашем регионе, относится к так называемому тобольскому кряжу, который характеризуется крупными размерами и светлой окраской меха. Встречается соболь повсеместно, однако предпочитает таежные биотопы, лишь изредка посещая массивы водораздельных болот.



Колонок в заповеднике очень редок. В зимний период, как правило, отмечаются лишь единичные встречи следов. Другие мелкие куньи – ласка и горностай встречаются гораздо чаще.

Барсук в заповеднике очень редок. В течение года отмечаются только единичные встречи следов жизнедеятельности этого зверя. Обычна и широко распространена росомаха.

Первые выпуски американской норки в округе проведены в 1936 г. С тех пор она размножилась и заняла все пригодные местообитания. Выдра встречается значительно реже, однако также является обычным обитателем многих водоемов заповедника.

Во время зимних миграций возможен заход в заповедник песца. В поймах крупных рек обычна лисица, но численность ее невысока. Основной ее корм – лесные полевки, зайцы, тетеревиные птицы. Изредка отмечаются встречи с животными, имеющими темную окраску меха, так называемыми “чернобурками”.



Волк в заповеднике редок. Его рас-





от 24 ноября 2003 года.



Заказник расположен на Нижне - Обской низменности, на территории Ханты - Мансийского района Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Целями создания заказника являются охрана, восстановление и воспроизводство численности популяций диких зверей и птиц, ценных промысловых рыб, а также охрана среды обитания диких животных, редких и ценных видов растений.

## Растительный мир

На территории заказника отмечено 276 видов сосудистых растений из 212 родов и 58 семейств.

Биологическая структура сосудистой флоры заказника насчитывает 10 видов настоящих и 7 видов кустовидных деревьев, 13 видов кустарников и 1 вид кустарничков, 3 вида полукустарников и 1 вид полукустарничков, 197 видов травяных многолетников и 44 вида травяных малолетников. Среди травянистых многолетников отмечено 95 вегетативно подвижных и 79 видов вегетативно малоподвижных наземных трав и 23 вида водных трав. В заказнике найдено 7 видов, занесенных в Красную книгу Ханты - Мансийского автономного округа - Югры: лук угловатый, колеант маленький, повойничек водноперечный, касатик сибирский, медуница мягкая, норичник узловатый, вероника колосистая.



пространение ограничивает низкая плотность копытных и глубокоснежные зимы. Ежегодно отмечаются лишь единичные встречи. Хотя, по словам хантов, иногда в заповедник забредают стаи до 10 –11 зверей.

На охраняемой территории и в прилегающих районах изредка встречается рысь, основным кормом которой является заяц-беляк.

Типичный представитель таежной фауны – бурый медведь – встречается повсеместно. Период пробуждения от зимней спячки приходится на начало апреля. С медведицей ходят обычно 1–2 медвежонка, очень редко больше. Ближе к осени медведи перемещаются в те районы, где созревают различные ягоды. Охотно употребляют в пищу смородину, черемуху, чернику, голубику. В сентябре – октябре обычно пасутся на болотах, собирая клюкву. В урожайные на кедровый орех годы перемещаются в кедровники, питаясь исключительно орехами.

Копытные представлены двумя аборигенными видами – лосем и северным оленем.

В марте северного оленя можно наблюдать с воздуха на обширных верховых болотах, где они пасутся группами до 20–30 животных. В это время плотная корка наста, выдерживающая их вес, позволяет свободно перемещаться в поисках пищи. Обилие гнуса в летний период вынуждает оленей спасаться на хорошо обдуваемых участках – крутых речных берегах, различных чистинах. В последние годы в регионе усилилось браконьерство вплоть до преследования оленей с вертолетов, общее количество оленей снизилось.



Излюбленные местообитания лося – пойменные темно - хвойные и смешанные леса. Лось охотно использует для передвижения и кормежки сейсмологические профили, прорубленные до организации заповедника. Для лосей и оленей характерны регулярные сезонные перемещения.



## Природный парк окружного значения «Кондинские озера»


**Парк «Кондинские озёра»** - образованный как районное учреждение 22 июня 1995 года. При определении границ парка основной предпосылкой являлась необходимость максимально возможного сохранения водной системы Кондинских озер. С запада природный парк граничит с Верхне-Кондинским федеральным природным заказником, а с востока к территории парка примыкают лицензионные участки интенсивно разрабатываемых нефтяных месторождений.

Основу территории природного парка составляет система озер, расположенных вдоль левого берега реки Конда, включающая в себя озера Арантур, Пон-Тур, Ранге-Тур.

Самое большое озеро - Арантур. Его площадь составляет 1165 га, при этом средняя глубина всего около полутора метров. Берега Арантура в основном низкие, твердые, песчаные. Большую часть



си.







## Государственный природный заказник «Елизаровский»

**Государственный заказник федерального подчинения «Елизаровский»** утвержден Приказом Минсельхоза РФ № 1500

лого пестрого дятлов, вертишейки, скворца, козодоя.



На территории заповедника гнездятся особо охраняемые редкие птицы: орлан-белохвост, скопа, филин. Сравнительно регулярно встречаются беркут, краснозобая казарка, сапсан, стерх, малый лебедь, кречет, кулик-сорока, серый сорокопут иногда отмечаются на пролетах. Особую ценность представляет стерх, или белый журавль, — исчезающий вид, внесенный в международную и национальную Красные книги.



В то же время в фауне заповедника довольно обычны позвоночные, свойственные северной тайге и тундре, такие как росомаха, северный олень, белая куропатка, овсянка-крошка, гуменник.

В заповеднике обитает медведь. Еще один вид крупных млекопитающих, в определенный сезон года связанный с борами - беломошниками, – это дикий северный олень. Ягельные сосняки в зимний период относятся к числу основных оленьих пастбищ. Ласка – самый маленький хищник заповедника, здесь обитает не более 260 этих зверьков. Так же, как это касается горностая, благополучие ласки зависит от плотности заселения угодий более сильными и крупными хищниками – соболем и горностаем, ее пищевыми конкурентами. В зимы с глубоким снегом и сильными морозами на обширных болотах в северной части заповедника можно увидеть следы песца. В последнее десятилетие волк стал обычным для заповедника видом. Особо охраняемым видом является североазиатский речной бобр, занесенный в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.






Из рыб наиболее широко распространена в районе заповедника щука. Она встречается на всей территории и по всем водоемам – в озерах, в речных старицах, а также в реках и ручьях. В озерах и многочисленных старицах обитают обыкновенный (или золотой) и серебряный кара-



береговой линии занимают светлые боры, но местами встречаются очень живописные участки лугового и болотного разнотравья.




Второе по величине озеро Ранге-Тур - самое южное из озер. Оно имеет округлую форму и низкие, по большей части, болотистые берега. С севера и востока озеро окружает большой массив верхового сфагнового болота, которое очень богато клюквой. Только с юга и северо-запада к его берегам подходят светлые сосняки. Для сохранения уникального водно-болотного комплекса озеро Ранге-Тур и береговая зона шириной 1 км от уреза воды в 1988 году объявлена памятником природы местного значения.

Всего на территории природного парка произрастает 328 видов дикорастущих видов сосудистых растений. Из них более 80 видов обладают лечебными свойствами, около 30 видов являются съедобными, четвертая часть видового состава растений имеют декоративные свойства, 22 вида являются нуждающимися в особой охране. Это редкие и исчезающие растения РФ и региона (кувшинка четырехгранная, кувшинка чистобелая, волчеягодник обыкновенный и др.), виды, находящиеся на границе ареала (чина весенняя, горечавка легочная, гвоздика разноцветная и др.), ценные реликтовые виды (вероника колосистая, прострел желтеющий, пазник крапчатый и др.), представители семейства орхидных (любка двулистная, пальчатокоренник гебридский, гудайера ползучая).



## Животный мир



Территория природного парка значительно заболочена: болота занимают около 50 %. Местами лесоболотные комплексы простираются на многие десятки и сотни гектаров и являются наиболее подходящими местообитаниями для многих видов животных и боровой дичи.

Основные представители фауны парка: соболь, лось, горностай, ласка, заяц-беляк, белка. Но здесь же встречаются и те виды млекопитающих и птиц, которые характерны для северной тайги и тундры (росомаха, таежный подвид дикого северного оленя, белая куропатка, гусь - гуменник и др.).

На сегодняшний день в природном парке и на прилегающих к нему территориях зарегистрировано 37 видов млекопитающих, 178 видов птиц, 11 видов рыб, 3 вида земноводных и 2 вида пресмыкающихся. Из них в особой охране нуждаются виды, занесенные в Красную книгу и ценные охотничье-промысловые виды, численность которых оказалась значительно подорванной в результате неразумного хозяйственного освоения таежных ресурсов в последние десятилетия. Особого внимания требуют к себе два вида млекопитающих - североазиатский речной бобр и дикий





щее время в заповеднике известно 390 видов, из которых 349 - аборигенные и 41 - заносные.

Во флоре заповедника 16 видов древесных и древесно-кустарниковых растений, 30 видов кустарников и полукустарников, 11 – кустарничков и полукустарничков, 297 - многолетних трав и 34 – одно - двулетников.

Из деревьев самый обычный вид - сосна лесная (обыкновенная), малотребовательная к теплу и влаге, устойчивая к огню, формирующая различные типы сосняков от лишайниковых до сфагновых. Ель сибирская – основная лесообразующая порода темнохвойных лесов – чаще растет в долинах рек, речек, ручьев, реже образует материковые ельники. Менее распространен кедр сибирский (сосна сибирская), чаще растущий в приречных темнохвойных лесах, где достигает наибольших размеров. Пихта сибирская по распространению уступает уже названным деревьям, наилучшие условия находит по берегам рек в составе прибрежных ельников. Как примесь в заповедных лесах растет лиственница сибирская. Значительное участие в образовании лесов принимают береза пушистая, растущая на заболоченных территориях, и береза повислая - на более сухих участках.

В долинах рек обычны финиколистная, лапландская и русская ивы, ольховник, черемуха.

## Животный мир

На территории заповедника зарегистрировано 180 видов птиц. В фауне заповедника насчитывается 38 видов млекопитающих. Имеется 1 вид пресмыкающихся и 2 вида земноводных, 13 видов рыб.

В зоогеографическом отношении фауна заповедника не представляет собой какого-либо уникального феномена, но по - своему своеобразна. В пределах заповедника или близ него проходит северная граница распространения обыкновенной гадюки и серой жабы, рыси, барсука, колонка, куницы, мыши-малютки, лесной мышовки, рыжей полевки.

Среди птиц таких видов значительно больше регулярное или эпизодическое гнездование установлено для кобчика, осоеда, пустельги, воробьиного и мохноногого сычей, черного стрижа, седого дятла, сойки, сороки, дубоноса, чижа, обыкновенной пищухи, зеленой пеночки, зарянки, серой утки, белоспинного и ма-

## Государственный природный заповедник «Малая Сосьва»

**Государственный природный заповедник «Малая Сосьва»** расположен в Советском и Березовском районах Ханты - Мансийского автономного округа. Заповедник расположен в долине реки Малая Сосьва и служит резерватом аборигенных популяций сибирского речного бобра, редких и исчезающих видов растений, основан 17 февраля 1976 года.

Заповедник образован с целью сохранения и изучения в естественном состоянии типичных экосистем западносибирской тайги. Особая задача – восстановление редких и особо ценных растений и животных региона.


### Растительный мир

Флора насчитывает более 500 видов растений. В заповеднике отмечено значительное число растений, характерных для южнее расположенных природных зон. Это – лесостепные, неморальные и южно-таежные виды. В настоящее время в заповеднике еще не завершены работы по выявлению разнообразия низших растений. Не имеется сведений о водорослях. Трудно судить и о том, насколько заповедник богат грибами, – специальных микологических исследований не проводилось. Имеющаяся в заповеднике коллекция грибов в настоящее время составляет около 150 видов. В лесах заповедника обнаружено более 40 видов грибов, возбуждающих болезни древесных пород. В настоящее время для заповедника известно 138 видов мохообразных и 121 - лишайников. Наиболее изучен видовой состав сосудистых растений. В настоя-



северный олень.

Кроме того, на территории природного парка отмечены 5 видов птиц, занесенных в Красную книгу: краснозобая казарка, скопа, беркут, сапсан и орлан-белохвост. Особой охраны требуют и встречающиеся редкие, малоизученные и сокращающиеся в числе птицы региона - чернозобая гагара, краснозобая гагара, лебедь-кликун, филин, осоед, полевой лунь и другие.



## Природный парк «Сибирские Увалы»

**Природный парк «Сибирские Увалы»** - организован осенью 1998 года. Располагается в северо – восточной части Нижневартовского района, в нём охраняются уникальные лиственные, кедровые леса, сосняки - беломошники, редкие виды растений.

## Животный мир



Здесь обитает три «краснокнижных» вида птиц, а всего на территории района около 120 видов птиц.

## Растительный мир

Здесь обнаружено 192 вида высших сосудистых растений, 57 видов лишайников и 67 видов дереворазрушающих грибов.

Из растительного покрова очень интересны лобария легочная, которая относится к исчезающим низшим растениям и реликтово - лиственничный древостой, возраст которого 500 лет.



## Природный парк «Самаровский Чугас»

**Природный парк «Самаровский Чугас»** расположен в междуречье Оби и Иртыша и представляет собой уникальное образование: его холмы не могли не удивлять своей высотой древних жителей края – угров, а потом и пришедших сюда охотников и рыбаков – хантов. Последние дали название этой местности (на языке иртышских хантов «чугас» означает «одинокий остров, покрытый таежным лесом, над поймой реки»).

Территория природного парка представляет собой кедрово - еловый массив, а также ручьи, болота, побережья рек, острова на реке Обь. Парк выполняет задачи по обеспечению охраны природной среды, сохранению и изучению историко-культурного





ром Казыма, а с северо - запада к нему примыкают бассейны Ай-Надыма, Левой Хетты, Полуя.

Водно-болотные угодья являются одной из наиболее продуктивных сред мира, истоками биологического разнообразия, которые обеспечивают выживание многих видов флоры и фауны, поддерживают высокие концентрации многочисленных водоплавающих птиц, млекопитающих, земноводных, рыб и беспозвоночных.

## Растительный мир

Леса Нумто не относятся к доминирующим комплексам, но их роль значительна. Здесь встречается свыше 10 типов кедровников. На торфяниках крупнобугристых тундр кедр возобновляется очень активно и семяношение его наступает достаточно рано. Кедровые леса являются хорошей кормовой базой для таежных птиц и зверей. Значительный интерес с точки зрения хозяйственного использования представляют ягельниковые сосняки, или боры - беломошники. Сочетание тундровых, лесотундровых и таежных ландшафтов позволяло оптимально сочетать такие виды традиционной хозяйственной деятельности, как оленеводство, охота, рыбная ловля и собирательство.





браконьерства.

На территории парка - богатый видовой состав насекомых, в том числе - вредителей леса и, так называемого, "гнуса".



Большинство видов фауны играет важную роль в жизни леса, содействуя его росту и развитию, возобновлению. К примеру, многие насекомые выполняют роль опылителей лесных растений, птицы разносят семена, все животные находятся в пищевых цепях.



## Природный парк «Нумто»

**Природный парк окружного значения «Нумто»** – самый большой по площади на территории Югры и особенно интересен этнокультурным наследием трех сибирских народов: ханты, манси, ненцы. Помимо решения задач экологического и научно-просветительского характера природный парк «Нумто» идеально подходит для развития регулируемого экологического, спортивного и научно-исследовательского туризма с целью знакомства с дикой природой и достопримечательностями историко-культурного комплекса.



Территория парка находится в центре Западно-Сибирской равнины и относится к Надымской провинции подзоны северной тайги. Парк окружен практически со всех сторон интенсивно разрабатываемыми месторождениями. Располагаясь на границе Ямало - Ненецкого и Ханты - Мансийского автономных округов, он занимает особое положение в географии, экологии, этнографии Тюменского Севера.



В гидрографическом отношении Нумто является истоком реки Надыма, его водосбор на юге и западе граничит с водосбо-



наследия, осуществлению рекреационного использования территории, а также экологического просвещения и научно-исследовательской деятельности.

## Растительный мир

Гордостью парка являются кедровые леса, которые занимают 44,2 % покрытых лесом земель. 18,6 % площади занимают ель, пихта и сосна, 37,6 % - мягколиственные (береза, осина, ивняки).

Растительный и животный мир Парка характерен для зоны средней тайги: на его территории выявлено 214 видов лишайников, 90 видов мхов, 261 вид грибов, 237 видов высших сосудистых растений.

## Животный мир

Фауна парка представлена различными видами зверей, птиц, рыб, земноводных, пресмыкающихся и насекомых. Выявлено 331 вид насекомых и около 200 видов позвоночных животных.

В различное время года видовой состав животного мира меняется. К зиме многие птицы улетают на юг, часть млекопитающих, земноводные, пресмыкающиеся, насекомые впадают в зимний сон.



На территории парка из млекопитающих встречаются: белка, бурундук, барсук, лисица, ласка, заяц-беляк, бурозубки (малая, обыкновенная и др.), полевки (рыжая, красно-серая и др.), лесная мышевка, крот обыкновенный. Гораздо реже в восточной части можно обнаружить следы бурого медведя, лося, соболя.

Более разнообразен в парке мир птиц. Наиболее часто здесь встречаются дятлы (трехпалый, черный), сойка, кедровка, серая ворона, ворон, вяхирь, кукушка, сорока. Большое разнообразие и малых птиц: большая - синица, свиристель, зяблик, пеночка - зарничка, малый зуек, соловей-красношейка, ласточка-береговушка, трясогузки (белая и черная), овсянки (обыкновенная и камышевая). Из куликов встречаются такие виды как чибис, бекас азиатский, кулик-перевозчик, большей кроншнеп и др. Произошло резкое сокращение численности боровой дичи (глухарь, тетерев, рябчик) по причине чрезмерного освоения территории и